

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

| Coltura   | Patologia   | Epoche d'impiego  | Dosi (g/hl) | Dosi (kg/ha) | N° max trattamenti all'anno |
|---|---|---|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>POMACEE</b><br>(Melo, Pero, Cotogno)   | Ticchiolatura, Cancri rameali, Batteriosi         | - Trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura   | 350-625     | 3,75-6       | 4                           |
|   |   | - Trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta  | 65-500      | 1-2,5        | 4                           |
| <b>DRUPACEE</b> (Pesco, Nectarino, Albicocco, Ciliegio, Susino) Solo Pesco, Nectarino e Albicocco per trattamenti post fioritura        | Bolla, Corineo, Batteriosi                        | - Trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali)   | 300-2100    | 3-6,25       | 4                           |
|   |   | - Trattamenti post fioritura  | 100-150     | 1-1,5        | 5                           |
| <b>VITE</b>   | Peronospora, Batteriosi                           | - Trattamenti pre-fiorali<br>- Trattamenti post-fiorali<br>- Trattamenti di "chiusura"                          | 250-500     | 2,5-5        | 8                           |
| <b>OLIVO</b>  | Occhio di Pavone, Lebbra, Batteriosi              | - Trattamenti da post raccolta all'invaiaitura  | 350-625     | 3,75-6,25    | 4                           |
| <b>ACTINIDIA</b>  | Batteriosi  | - Trattamenti a caduta foglie e invernali   | 495-700     | 4,95-7       | 4                           |
|   |   | - Trattamenti in vegetazione  | 100-200     | 1-2          | 8                           |
| <b>CARCIOFO, ASPARAGO</b>   | Peronospora, Batteriosi, Stemfiliosi              | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni) | 300-1000    | 2,5-5        | 5                           |
| <b>AGRUMI</b> (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)   | Alternaria, Gommosi, Batteriosi                   | - Trattamenti a partire da fine inverno   | 200-330     | 4-5          | 5                           |
| <b>NOCE, NOCCIOLO e altri FRUTTIFERI A GUSCIO</b>   | Alternaria, Batteriosi                            | - Trattamenti primaverili-estivi<br>- Trattamenti autunnali   | 250-625     | 3,5-6,25     | 3                           |
| <b>LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra</b>   | Peronospora, Alternaria, Batteriosi               |   | 350-1650    | 3,5-5        | 5                           |
| <b>CAVOLI</b> (Cavoli, Broccoli, Cavolfiore, ecc.)  | Peronospora, Alternaria, Batteriosi               |   | 250-1650    | 2,5-5        | 5                           |
| <b>CUCURBITACEE</b> (Cetriolo, Zucca, Zucchini, Melone, Cocomero ecc.) in campo e serra   | Peronospora, Alternaria, Batteriosi               |   | 250-1250    | 2,5-5        | 8                           |
| <b>POMODORO, MELANZANA in campo e serra</b>   | Peronospora, Alternaria, Batteriosi               |   | 375-2500    | 3,75-6,25    | 6                           |
| <b>PATATA</b>   | Peronospora, Batteriosi, Alternaria               |   | 375-2500    | 3,75-6,25    | 6                           |
| <b>ORTAGGI A RADICE</b> (Carota, Bietola rossa, Rapa, Pastinaca, Sedano rapa, Ravanello, Salsefrica, Rutabaga, Cicoria da radice, ecc.) | Alternaria, Batteriosi                            | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia  | 300-1000    | 2,5-5        | 5                           |
| <b>FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI</b>  | Peronospora, Batteriosi, Ruggini                  |   | 250-1250    | 2,5-5        | 5                           |
| <b>ORTAGGI A BULBO</b> (Aglio, Cipolla, Cipollina, Scalogno, ecc.)  | Alternaria, Batteriosi, Peronospora, Stemphyllium |   | 350-2500    | 3,5-5        | 5                           |
| <b>FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra</b>   | Peronospora, Antracnosi, Ruggine                  |   | 350-2500    | 3,5-5        | 3                           |